

DIGRAIN®



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство в виде готовой приманки помещают специальную приманочную станцию (входящую в комплект), либо в небольшие емкости (типа приманочных ящичков, лотков, коробок), специальные пластмассовые контейнеры, на подложки из плотной бумаги, полиэтилена или пластика по 5-10 г. (для мышей).

Средство размещают в местах обитания грызунов в сухих местах на расстоянии от 2 до 15 м., в зависимости от площади помещения, его захламленности, а так же вида и численности грызунов.

Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют, после первой раскладки через 2 дня. Затем один раз в неделю. Порции средства заменяют новыми по мере поедания или загрязнения.

Хранение осуществляют в невскрытой упаковке производителя, в сухих прохладных помещениях в местах, недоступных для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов, кормов и фуража, а так же лекарственных средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

средство должно быть недоступно для детей и домашних животных! При раскладывании приманки не принимать пищу, не пить и не курить! При работе использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки)! Не допускать попадания средства на кожу, в рот и глаза! После окончания работ руки тщательно вымыть теплой водой с мылом! Запрещается выбрасывать остатки приманки в мусорные ящики и водоемы!

Хранение осуществляют в невскрытой упаковке производителя, в сухих прохладных помещениях в местах, недоступных для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов, кормов и фуража, а так же лекарственных средств.

FLASH PASTE

ПРОТИВ МЫШЕЙ

Рекомендованная норма расхода - 5 - 10 г. продукта через каждые 3 метра (в зависимости от количества грызунов)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:

при случайном попадании приманки в организм человека возможно отравление с признаками общей слабости, тошноты, головной боли, сонливости. В этом случае немедленно отстранить пострадавшего от контакта со средством и принять срочные меры по удалению яда из организма.

При попадании средства:

на кожу - пораженное место тщательно промыть теплой водой с мылом;

в глаза - обильно промыть водой в течение 10-15 минут, затем закапать 2% раствор пищевой соды;

в желудок - немедленно выпить несколько стаканов воды и удалить средство из организма, вызвав рвоту (не позднее чем через 30 минут), затем дать солевое слабительное (столовую ложку глауберовой соли на два стакана воды) и активированный уголь (10-15 измельченных таблеток на стакан воды)

Пострадавшего и данную упаковку следует незамедлительно показать врачу.